

## Mittlere-Reife-Prüfung 2012 Mathematik II Aufgabe B1

### Aufgabe B1.

Die Parabel  $p$  verläuft durch die Punkte  $P(-5|-19)$  und  $Q(7|5)$ . Sie hat eine Gleichung der Form  $y = -0,25x^2 + bx + c$  mit  $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  und  $b, c \in \mathbb{R}$ . Die Gerade  $g$  ist festgelegt durch die Punkte  $R(0|2,5)$  und  $S(5|0)$ .

#### Aufgabe B1.1 (5 Punkte)

Zeigen Sie durch Berechnung der Werte für  $b$  und  $c$ , dass die Parabel  $p$  die Gleichung  $y = -0,25x^2 + 2,5x - 0,25$  hat und bestimmen Sie die Gleichung der Geraden  $g$ . Zeichnen Sie sodann die Parabel  $p$  für  $x \in [0;12]$  und die Gerade  $g$  in ein Koordinatensystem. Für die Zeichnung: Längeneinheit 1 cm;  $-1 \leq x \leq 14$ ;  $-7 \leq y \leq 7$

#### Aufgabe B1.2 (2 Punkte)

Punkte  $A_n(x|-0,5x+2,5)$  auf der Geraden  $g$  und Punkte  $D_n(x|-0,25x^2+2,5x-0,25)$  auf der Parabel  $p$  haben dieselbe Abszisse  $x$  und sind zusammen mit Punkten  $B_n$  und  $C_n$  die Eckpunkte von Trapezen  $A_n B_n C_n D_n$ .  
Es gilt:  $[A_n B_n] \parallel [C_n D_n]$ ;  $\angle B_n A_n D_n = 90^\circ$ ;  $x_{A_n} < x_{B_n}$ ;  $\overline{A_n B_n} = 4$  LE und  $\overline{C_n D_n} = 2$  LE.  
Zeichnen Sie die Trapeze  $A_1 B_1 C_1 D_1$  für  $x = 2$  und  $A_2 B_2 C_2 D_2$  für  $x = 9$  in das Koordinatensystem zu 1.1 ein

#### Aufgabe B1.3 (2 Punkte)

Bestätigen Sie durch Rechnung, dass für den Flächeninhalt  $A$  der Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$  in Abhängigkeit von der Abszisse  $x$  der Punkte  $A_n$  gilt:  
 $A(x) = (-0,75x^2 + 9x - 8,25)$  FE

#### Aufgabe B1.4 (2 Punkte)

Ermitteln Sie rechnerisch, für welche Werte von  $x$  es Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$  gibt.

#### Aufgabe B1.5 (2 Punkte)

Unter den Trapezen  $A_n B_n C_n D_n$  besitzt das Trapez  $A_0 B_0 C_0 D_0$  den maximalen Flächeninhalt.  
Bestimmen Sie den Flächeninhalt des Trapezes  $A_0 B_0 C_0 D_0$  und den zugehörigen Wert für  $x$ .

#### Aufgabe B1.6 (4 Punkte)

Bestimmen Sie im Trapez  $A_2 B_2 C_2 D_2$  aus Aufgabe 1.2 rechnerisch das Maß des Winkels  $\angle C_2 B_2 A_2$ . Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma.  
Begründen Sie sodann, dass es kein Trapez  $A_n B_n C_n D_n$  gibt, für das gilt:  $\angle C_n B_n A_n = 75^\circ$ .

## Lösung

### Aufgabe B1.

Die Parabel  $p$  verläuft durch die Punkte  $P(-5|-19)$  und  $Q(7|5)$ . Sie hat eine Gleichung der Form  $y = -0,25x^2 + bx + c$  mit  $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  und  $b, c \in \mathbb{R}$ . Die Gerade  $g$  ist festgelegt durch die Punkte  $R(0|2,5)$  und  $S(5|0)$ .

#### Aufgabe B1.1 (5 Punkte)

Zeigen Sie durch Berechnung der Werte für  $b$  und  $c$ , dass die Parabel  $p$  die Gleichung  $y = -0,25x^2 + 2,5x - 0,25$  hat und bestimmen Sie die Gleichung der Geraden  $g$ . Zeichnen Sie sodann die Parabel  $p$  für  $x \in [0;12]$  und die Gerade  $g$  in ein Koordinatensystem. Für die Zeichnung: Längeneinheit 1 cm;  $-1 \leq x \leq 14$ ;  $-7 \leq y \leq 7$

#### Lösung zu Aufgabe B1.1

##### Funktionsgleichung ermitteln

Gegeben:

$$p: y = -0,25x^2 + bx + c$$

$P(-5|-19)$  und  $Q(7|5)$  liegen auf  $p$ .

Gesucht sind die Parameter  $b$  und  $c$ .

Erläuterung: *Gleichungssystem aufstellen*

Die Punkte  $P$  und  $Q$  werden in die Parabelgleichung  $p$  eingesetzt.  
Man erhält ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten  $b$  und  $c$ .

$$\begin{aligned} P: -19 &= -0,25 \cdot (-5)^2 + b \cdot (-5) + c \\ Q: 5 &= -0,25 \cdot 7^2 + b \cdot 7 + c \end{aligned}$$

Erläuterung: *Erläuterung*

Die Gleichungen werden ab hier mit I. und II. gekennzeichnet.

$$\begin{array}{l} \text{I.} \quad -19 = -6,25 - 5b + c \\ \text{II.} \quad 5 = -12,25 + 7b + c \quad | \cdot (-1) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{I.} \quad -19 = -6,25 - 5b + c \\ \text{II.} \quad -5 = 12,25 - 7b - c \end{array}$$

Erläuterung: *Gleichungssystem lösen - Additionsverfahren*

Die zweite Gleichung wird mit  $-1$  multipliziert. Somit kommt in der ersten Gleichung der Term  $c$  und in der zweiten Gleichung der Term  $-c$  vor. Danach werden die beiden Gleichungen addiert, wodurch der Parameter  $c$  verschwindet.

$$\begin{array}{l} \text{I+II.} \quad -24 = 6 - 12b \quad | \quad -6 \\ \quad \quad -30 = -12b \quad | \quad :(-12) \\ \quad \quad \quad b = 2,5 \end{array}$$

$b = 2,5$  in I. einsetzen:

$$\begin{array}{l} -19 = -6,25 - 5 \cdot 2,5 + c \\ -19 = -6,25 - 12,5 + c \\ c = -0,25 \end{array}$$

Erläuterung: *Einsetzen*

$b = 2,5$  und  $c = -0,25$  werden in die Parabelgleichung eingesetzt.


$$\Rightarrow p: y = -0,25x^2 + 2,5x - 0,25$$

**Geradengleichung aufstellen**

Gegeben:  $R(0|2,5)$ ,  $S(5|0)$ ,  $R, S \in g$

Gesucht:  $g$

Erläuterung: *Geradengleichung*



Die Funktionsgleichung einer Geraden lautet:

$$y = m \cdot x + t$$

Dabei ist:

$m$  die Steigung der Geraden  
 $t$  der  $y$ -Achsenabschnitt

$$g: y = mx + t$$

Erläuterung: *Zwei-Punkte-Form*

Steigung einer Geraden mit der Zwei-Punkte-Form:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{Hier: } m = \frac{y_R - y_S}{x_R - x_S} = \frac{2,5 - 0}{0 - 5}$$

Steigung  $m$  bestimmen:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2,5 - 0}{0 - 5} = \frac{2,5}{-5} = -0,5$$

$$y = -0,5x + t$$

Erläuterung: *Einsetzen*

Der Punkt  $R$  wird in  $y = -0,5x + t$  eingesetzt um den  $y$ -Achsenabschnitt  $t$  zu bestimmen.

$y$ -Achsenabschnitt  $t$  bestimmen:

$$R : 2,5 = -0,5 \cdot 0 + t$$

$$t = 2,5$$

$$\Rightarrow g : y = -0,5x + 2,5$$

**Skizze**

Scheitelpunkt  $S(x_S|y_S)$  der Parabel bestimmen:

Erläuterung: *Scheitelpunkt einer Parabel bestimmen*

Eine quadratische Funktion der Form  $y = ax^2 + bx + c$  besitzt folgenden Scheitelpunkt  $S$ :

$$S \left( -\frac{b}{2a} \mid c - \frac{b^2}{4a} \right) \quad (\text{siehe Formelsammlung})$$

Der Scheitelpunkt wird hier berechnet um die Parabel leichter einzeichnen zu können.


$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{2,5}{-2 \cdot 0,25} = 5$$

$$y_S = 6$$

$$\Rightarrow S(5|6)$$

Wertetabelle für die Parabel erstellen:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y	-0,25	2	3,75	5	5,75	6	5,75	5	3,75	2	-0,25	-3	-6,25



### Aufgabe B1.2 (2 Punkte)

Punkte  $A_n(x | -0,5x + 2,5)$  auf der Geraden  $g$  und Punkte  $D_n(x | -0,25x^2 + 2,5x - 0,25)$  auf der Parabel  $p$  haben dieselbe Abszisse  $x$  und sind zusammen mit Punkten  $B_n$  und  $C_n$  die Eckpunkte von Trapezen  $A_n B_n C_n D_n$ .

Es gilt:  $[A_n B_n] \parallel [C_n D_n]$ ;  $\angle B_n A_n D_n = 90^\circ$ ;  $x_{A_n} < x_{B_n}$ ;  $\overline{A_n B_n} = 4$  LE und  $\overline{C_n D_n} = 2$  LE.

Zeichnen Sie die Trapeze  $A_1 B_1 C_1 D_1$  für  $x = 2$  und  $A_2 B_2 C_2 D_2$  für  $x = 9$  in das Koordinatensystem zu 1.1 ein

### Lösung zu Aufgabe B1.2

**Skizze**


Trapeze  $A_1 B_1 C_1 D_1$  und  $A_2 B_2 C_2 D_2$  eintragen:

Erläuterung: *Einzeichnen*

Vorgehensweise für das Einzeichnen:

1. Punkte  $A_1$  und  $D_1$  auf der Geraden bzw. Parabel bei  $x = 2$  einzeichnen und zur Strecke  $[A_1 D_1]$  verbinden.
2. Der Punkt  $B_1$  ist 4 LE von  $A_1$  entfernt. Wegen dem rechten Winkel bei  $A_1$ , ist  $[A_1 B_1]$  parallel zur  $x$ -Achse.
3. Der Punkt  $C_1$  ist 2 LE von  $D_1$  entfernt. Die Strecke  $[D_1 C_1]$  ist parallel zu  $[A_1 B_1]$ .

Analoges gilt für das Trapez  $A_2 B_2 C_2 D_2$ .




### Aufgabe B1.3 (2 Punkte)

Bestätigen Sie durch Rechnung, dass für den Flächeninhalt  $A$  der Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$  in Abhängigkeit von der Abszisse  $x$  der Punkte  $A_n$  gilt:

$$A(x) = (-0,75x^2 + 9x - 8,25) \text{ FE}$$


### Lösung zu Aufgabe B1.3

*Flächeninhalt eines Trapezes*



Gegeben:  $A_n(x | -0,5x + 2,5)$ ,  $D_n(x | -0,25x^2 + 2,5x - 0,25)$ ,  $\overline{A_n B_n} = 4 \text{ LE}$  und  $\overline{D_n C_n} = 2 \text{ LE}$

Erläuterung: *Fläche eines Trapezes*



Ein Trapez mit den Grundseiten  $a$  und  $b$  und der Höhe  $h$  hat einen Flächeninhalt von:

$$A = \frac{1}{2} \cdot (a + b) \cdot h \text{ Hier gilt:}$$

$$a = \overline{A_n B_n}, \quad b = \overline{D_n C_n}, \quad h = \overline{A_n D_n}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot (\overline{A_n B_n} + \overline{D_n C_n}) \cdot \overline{A_n D_n}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot (4 + 2) \cdot \overline{A_n D_n}$$

Erläuterung: *Abstand zweier Punkte*

Die Länge der Strecke  $\overline{A_n D_n}$  ist gleich dem Abstand der Punkte  $A_n$  und  $D_n$ .

Da die Punkte  $A_n$  und  $B_n$  die gleich Abszisse  $x$  haben, entspricht ihr Abstand der Differenz ihrer Ordinaten.

$$\begin{aligned} \overline{A_n D_n} &= y_{D_n} - y_{A_n} \\ \overline{A_n D_n} &= -0,25x^2 + 2,5x - 0,25 - (-0,5x + 2,5) \\ \overline{A_n D_n} &= (-0,25x^2 + 3x - 2,75) \quad \text{LE} \end{aligned}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot (-0,25x^2 + 3x - 2,75)$$


$$A(x) = (-0,75x^2 + 9x - 8,25) \quad \text{FE}$$

### Aufgabe B1.4 (2 Punkte)

Ermitteln Sie rechnerisch, für welche Werte von  $x$  es Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$  gibt.

### Lösung zu Aufgabe B1.4

#### Schnittpunkt zweier Funktionen



Erläuterung: *Erläuterung*

Wenn man über die Schnittpunkte hinaus geht, so entstehen zwar trotzdem Trapeze, aber diese haben nicht die gleiche Orientierung wie die Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$ . Es entstehen, wie in Bild eingezeichnet, Trapeze  $D_n C_n B_n A_n$ .

Nur zwischen den Schnittpunkten gibt Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$ .

Schnittpunkte bestimmen:

Erläuterung: *Schnittpunkt zweier Funktionsgraphen*

Die Graphen zweier Funktionen schneiden sich dort, wo sie ein übereinstimmendes Wertepaar  $(x, y)$ , einen gemeinsamen Punkt, besitzen.

Man setzt die Funktionsgleichungen gleich und löst nach  $x$  auf.

$$\begin{aligned} p \cap g: \quad -0,25x^2 + 2,5x - 0,25 &= -0,5x + 2,5 \\ -0,25x^2 + 3x - 2,75 &= 0 \end{aligned}$$

Erläuterung: *Mitternachtsformel - Lösungsformel für quadratische Gleichungen*

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot (-0,25) \cdot (-2,75)}}{2 \cdot (-0,25)}$$

$$x_1 = 11 \vee x_2 = 1$$

Erläuterung: *Erläuterung*

Die  $x$ -Werte 1 und 11 werden ausgeschlossen, da an dieser Stelle die  $y$ -Koordinate von  $A_n$  und  $D_n$  gleich ist und kein Trapez entstehen kann.

Es existieren Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$  für  $x \in ]1; 11[$ .


#### Aufgabe B1.5 (2 Punkte)

Unter den Trapezen  $A_n B_n C_n D_n$  besitzt das Trapez  $A_0 B_0 C_0 D_0$  den maximalen Flächeninhalt.

Bestimmen Sie den Flächeninhalt des Trapezes  $A_0 B_0 C_0 D_0$  und den zugehörigen Wert für  $x$ .

#### Lösung zu Aufgabe B1.5

##### *Extremwertaufgabe*



Flächeninhalt  $A$  der Trapeze  $A_n B_n C_n D_n$ :

$$A(x) = (-0,75x^2 + 9x - 8,25) \text{ FE} \quad (\text{s. Teilaufgabe 1.3})$$

$$x_{\max} = x_{A_0} = x_{D_0} = x_S \text{ von } A(x)$$

$$x_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{9}{2 \cdot (-0,75)} = 6$$

$$\Rightarrow A_{A_0 B_0 C_0 D_0} = A(6) = 18,75 \text{ FE}$$


#### Aufgabe B1.6 (4 Punkte)

Bestimmen Sie im Trapez  $A_2 B_2 C_2 D_2$  aus Aufgabe 1.2 rechnerisch das Maß des Winkels  $\angle C_2 B_2 A_2$ . Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma.

Begründen Sie sodann, dass es kein Trapez  $A_n B_n C_n D_n$  gibt, für das gilt:  $\angle C_n B_n A_n = 75^\circ$ .

#### Lösung zu Aufgabe B1.6

##### *Winkel bestimmen*



Betrachtet wird das rechtwinklige Dreieck  $F_2 B_2 C_2$ . Es gilt:

$$\overline{F_2 B_2} = 2 \text{ LE}$$

$$\begin{aligned} \overline{C_2 F_2} &= \overline{A_2 D_2} \\ &= p(9) - g(9) \\ &= -0,25 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 - 2,75 \\ &= 4 \text{ LE} \end{aligned}$$

$$\tan \angle C_2 B_2 A_2 = \frac{\overline{C_2 F_2}}{\overline{F_2 B_2}} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\angle C_2 B_2 A_2 = \tan^{-1}(2) \approx 63,43^\circ$$

### Extremwertaufgabe

Überlegung:

Der größtmögliche Winkel befindet sich im Trapez  $A_0 B_0 C_0 D_0$ , da die Höhe  $\overline{C_0 F_0}$  des Dreiecks  $F_0 B_0 C_0$  die längste Höhe aller Dreiecke  $F_n B_n C_n$  ist.

$$\begin{aligned} \overline{C_0 F_0} &= \overline{A_0 D_0} \\ &= p(6) - g(6) \\ &= -0,25 \cdot 6^2 + 3 \cdot 6 - 2,75 \\ &= 6,25 \text{ LE} \end{aligned}$$

$$\tan \angle C_0 B_0 A_0 = \frac{\overline{A_0 D_0}}{\overline{F_0 B_0}} = \frac{6,25}{2} = 2$$

$$\angle C_0 B_0 A_0 = \tan^{-1}(2) \approx 72,26^\circ < 75^\circ$$

⇒ Es gibt kein Trapez dessen Winkel  $\angle C_n B_n A_n$  größer als  $75^\circ$  ist.